



人生难免有起伏 但是您可保有珍视 的人事物



NUBEQA®使用指南

NUBEQA发音为new-BECCA

什么是NUBEQA®？

NUBEQA® (darolutamide) 是一种处方药，用于治疗符合以下情况的前列腺癌成年患者：

- 前列腺癌未扩散到身体其他部位，且对降低睾酮水平的药物或手术不再有反应
- 前列腺癌已扩散到身体其他部位，且对降低睾酮水平的药物或手术有反应
- 前列腺癌已扩散到身体其他部位，且对联合多西他赛降低睾酮水平的药物或手术有反应。

目前尚不了解NUBEQA对女性或者儿童是否安全有效。

重要安全信息

在服用NUBEQA之前，告诉医疗服务提供者您的所有病症，包括您是否：

- 患有心脏病、高血压、糖尿病，或血液中脂肪或胆固醇含量过高 (血脂异常)
- 有癫痫发作、脑损伤、中风或脑肿瘤病史
- 患有肾脏或肝脏疾病

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 **14-15** 页关于NUBEQA的重要事实，以及 NUBEQA.com/PI 上的完整处方信息。

关于NUBEQA®

NUBEQA是一种处方药，
经批准用于治疗某些类型
的晚期前列腺癌



Tablets shown are
not actual size

您是否想了解NUBEQA的治疗效果，或是照护者的专属资源？

请用下方按钮直接跳至该部分。

若您的前列腺癌已**扩散**至身体其他部位（
转移性），且对**ADT***有反应，请了解与您
相关的NUBEQA临床研究。

[查看这些临床研究的结果](#)

若您的前列腺癌尚未**扩散**至身体其他部位
(非转移性)，且对**ADT无反应**，请了解与
您相关的NUBEQA临床研究。

[查看这项临床研究的结果](#)



若您是照护者，请前往第13页获取支持。

*ADT (雄激素剥夺疗法) 指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

重要安全信息 (续)

在服用NUBEQA之前，告诉医疗服务提供者您的所有病症，包括您是否 (续)：

- 已怀孕或计划怀孕。NUBEQA可对未出生的胎儿造成伤害并导致流产
- 有可以受孕的伴侣。男性患者若其女性伴侣可以受孕，应在治疗期间及最后一次服用NUBEQA后的一周内采取有效的避孕措施。请与您的医疗服务提供者讨论避孕方法
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚NUBEQA是否会进入母乳

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实，以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。




NUBEQA®的作用机制

前列腺癌细胞如何生长？


前列腺癌細胞含有称为雄激素受体的特殊蛋白质。当睾酮激素与这些受体结合时，会触发促使前列腺癌細胞生长的过程。

NUBEQA如何延缓前列腺癌生长？

NUBEQA作为雄激素受体阻断剂，会附着在癌细胞内的雄激素受体上，阻断睾酮结合。通过阻断睾酮结合，NUBEQA可能有助于延缓癌細胞生长。



睾酮与雄激素受体结合，
导致前列腺癌细胞增殖



NUBEQA通过阻断睾酮与雄激素受体
结合，帮助延缓癌细胞生长

重要安全信息(续)

请告诉医疗服务提供者您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。NUBEQA可能影响其他药物的起效方式，其他药物也可能影响NUBEQA的起效方式。

在与开具NUBEQA处方的医疗服务提供者讨论之前，请勿开始或停止使用任何药物。

了解您所使用的药物。保留一份您的药物清单，以便在您获得新药时向医疗服务提供者和药剂师出示。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实，以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。



服用NUBEQA®

NUBEQA是片剂

每日两次，每次两片，随餐服用

服用NUBEQA期间请遵医嘱



如何服用NUBEQA？

- 严格按照医生的指示服用NUBEQA
- 若出现某些副作用，医生可能会调整剂量、暂时停药或完全停止NUBEQA治疗。在与医生讨论前，请勿停用NUBEQA的处方剂量
- 每日两次，每次整片吞服两片药片，随餐服用
- 除非医生另有指示，服用NUBEQA期间应继续进行ADT*
- 若服用超过处方剂量的NUBEQA，请立即联系医生

如果我错过一剂NUBEQA，该怎么办？

- 请在想起时尽快服用您的处方剂量
- 不要通过一次服用两剂来弥补错过的剂量

*ADT (雄激素剥夺疗法) 指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

重要安全信息(续)

NUBEQA可能引起严重副作用，包括：

- 心脏病。**在接受NUBEQA治疗期间，部分患者出现心脏动脉阻塞(缺血性心脏病)，可能导致死亡。在您接受NUBEQA治疗期间，医疗服务提供者会监测您是否出现心脏问题的症状和体征。在您接受NUBEQA治疗期间，若休息或活动时出现胸部疼痛或不适，或者呼吸急促，请立即联系您的医疗服务提供者或就医。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实，以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。



NUBEQA®为个性化治疗决策提供选择方案

若您患有对ADT*有反应的转移性前列腺癌



供您与医生选择的有 **2种** 治疗方案：

● NUBEQA + ADT

或者

● NUBEQA + ADT + CHEMO[†]

联合化疗治疗对ADT有反应的转移性前列腺癌

NUBEQA并非化疗药物，但其获批的用途之一是与一种名为多西他赛 (docetaxel) 的化疗药物联合使用，用于治疗对ADT有反应的转移性前列腺癌。

- 化疗通过手臂静脉输注 (IV) 方式给药，每3周一次，最多6个周期
- 全部6个化疗周期将在NUBEQA治疗开始后的约前5个月内完成
- 必要时医生可调整、延迟或终止化疗
- 化疗完成后，可按医生处方继续接受NUBEQA治疗

*ADT (雄激素剥夺疗法) 指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

[†]化疗=多西他赛。

重要安全信息 (续)

NUBEQA可能引起严重副作用，包括 (续) :

- **癫痫发作。**接受NUBEQA治疗可能增加癫痫发作的风险。应避免从事突然丧失意识可能对自身或他人造成严重伤害的活动。若在NUBEQA治疗期间出现意识丧失或癫痫发作，请立即告知您的医疗服务提供者。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 **14-15** 页关于NUBEQA的重要事实，以及 NUBEQA.com/PI 上的完整处方信息。



NUBEQA®已证实有效

适用于对ADT*有反应的转移性前列腺癌男性患者

在两项分别包含和不包含化疗†的临床试验中对NUBEQA进行了评估。‡
这让您和医生可以根据您的需求来定制治疗方案。

研究1

NUBEQA + ADT

NUBEQA

将癌症恶化的风险
减少将近两倍

一项临床研究显示,与仅接受ADT相比,
NUBEQA + ADT治疗将疾病进展风险降
低了46% ‡
(未达到中位数§对比25个月)。

研究2

NUBEQA + ADT + CHEMO

NUBEQA帮助男性患者

活得更久

与ADT + 化疗相比, NUBEQA + ADT + 化疗将
死亡风险降低了32%,从而延长总体生存期(未
达到中位数§对比48.9个月)。

在分析时显示,接受NUBEQA + ADT治疗的患者中,有29% (446例中有128例)通过影像学检查发现癌症恶化或已死亡;而仅接受ADT治疗的患者中,该比例为42%(223例中有94例)。

在分析时显示,接受NUBEQA + ADT + 化疗的患者中,有35% (651例中有229例)已死亡,而仅接受ADT + 化疗的患者中,
该比例为46% (654例中有304例)。

查看完整结果



*ADT (雄激素剥夺疗法) 指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

†化疗=多西他赛。

‡rPFS是通过影像学检查显示癌症恶化或受试者死亡来衡量。

§中位数是一组数字中的中间值,而不是平均值。

重要安全信息 (续)

NUBEQA最常见的副作用包括:

- 肝功能检查指标升高
- 白细胞减少(中性粒细胞减少症)
- 感觉比平时更疲倦

NUBEQA联合多西他赛最常见的副作用包括:

- | | |
|--------|-------------|
| • 便秘 | • 红细胞减少(贫血) |
| • 皮疹 | • 高血糖 |
| • 食欲下降 | • 白细胞减少 |
| • 出血 | • 肝功能检查指标升高 |
| • 体重增加 | • 低血钙 |
| • 高血压 | |

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实,以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。



NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg tablets

NUBEQA®的研究方法

用于对ADT*有反应的转移性前列腺癌男性患者

研究1

未采用化疗的临床研究



446人接受

NUBEQA



ADT

NUBEQA + ADT



223人接受

ADT

在一项针对669名男性的临床研究中,评估了接受NUBEQA + ADT的男性与仅接受ADT治疗的男性在放射学无进展生存期方面的差异。

研究2

采用化疗的临床研究



651人接受

NUBEQA



ADT



化疗

每3周一次,共6个周期,持续<5个月

NUBEQA + ADT + CHEMO



654人接受

ADT



化疗

每3周一次,共6个周期,持续5个月

在一项针对1305名男性的临床研究中,评估了接受NUBEQA + ADT + 化疗的男性患者与仅接受ADT+化疗的男性在总生存期方面的差异。

*ADT(雄激素剥夺疗法)指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

†化疗=多西他赛。

重要安全信息(续)

NUBEQA可能导致男性生育问题,从而影响生育能力。若对生育能力存在担忧,请咨询您的医疗服务提供者。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实,以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。



NUBEQA®已证实有效

适用于对ADT*无反应的非转移性前列腺癌患者

NUBEQA改善了患者生存期

延长2倍

无癌症扩散对
比仅接受ADT治疗

接受NUBEQA + ADT治疗的患者生存期是仅接受ADT治疗患者的两倍以上，且癌症未扩散至身体其他部位
(中位生存期 | 为3.4年对比1.5年)。

在分析时显示，接受NUBEQA + ADT治疗的患者中，有23% (955例中有221例) 出现癌症扩散或已死亡；而仅接受ADT治疗的患者中，该比例为39% (554例中有216例)。

对ADT无反应的非转移性前列腺癌开展的临床研究



955人接受

NUBEQA



ADT



554人接受

ADT

在一项针对1509名男性的临床研究中，比较了接受NUBEQA + ADT治疗的男性与仅接受ADT治疗的男

查看完整结果



*ADT(雄激素剥夺疗法)指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

†中位数是一组数字中的中间值，而不是平均值。

重要安全信息(续)

这些不是NUBEQA所有可能的副作用。

请致电您的医疗服务提供者，征求有关副作用的医疗建议。我们鼓励您访问

www.fda.gov/medwatch 或者致电 **1-800-FDA-1088**，向食品药品管

理局(FDA)报告副作用或对产品的品质投诉。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 **14-15** 页关于NUBEQA的重要事实，以及 NUBEQA.com/PI 上的完整处方信息。



NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets

副作用

用于对ADT*有反应的转移性前列腺癌男性患者

NUBEQA®可能引起严重副作用, 包括:

心脏病

在接受NUBEQA治疗期间, 部分患者出现心脏动脉阻塞(缺血性心脏病), 可能导致死亡。在您接受NUBEQA治疗期间, 医疗服务提供者会监测您是否出现心脏问题的症状和体征。在您接受NUBEQA治疗期间, 若休息或活动时出现胸部疼痛或不适, 或者呼吸急促, 请立即联系您的医疗服务提供者或就医。

癫痫发作

接受NUBEQA治疗可能增加癫痫发作的风险。应避免从事突然丧失意识可能对自身或他人造成严重伤害的活动。若在NUBEQA治疗期间出现意识丧失或癫痫发作, 请立即告知您的医疗服务提供者。

NUBEQA最常见的副作用包括:



肝功能检查
指标升高



白细胞减少
(中性粒细胞减少症)



感觉比平时更
疲倦

NUBEQA联合多西他赛最常见的副作用包括:

- 便秘
- 皮疹
- 食欲下降
- 出血
- 体重增加
- 高血压
- 红细胞减少(贫血)
- 高血糖
- 白细胞减少
- 肝功能检查指标升高
- 低血钙

NUBEQA可能导致男性生育问题, 从而影响生育能力。若对生育能力存在担忧, 请咨询您的医疗服务提供者。

这些不是NUBEQA所有可能的副作用。

请致电您的医生, 咨询与副作用有关的医学建议。您可致电1-800-FDA-1088或访问www.fda.gov/medwatch向食品药物管理局(FDA)报告副作用。

*ADT(雄激素剥夺疗法)指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

重要安全信息

在服用NUBEQA之前, 告诉医疗服务提供者您的所有病症, 包括您是否:

- 患有心脏病、高血压、糖尿病, 或血液中脂肪或胆固醇含量过高(血脂异常)

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实, 以及NUBEQA.com/PI 上的完整处方信息。



副作用

用于对ADT*无反应的非转移性前列腺癌患者

NUBEQA®可能引起严重副作用, 包括:

心脏病

在接受NUBEQA治疗期间, 部分患者出现心脏动脉阻塞(缺血性心脏病), 可能导致死亡。在您接受NUBEQA治疗期间, 医疗服务提供者会监测您是否出现心脏问题的症状和体征。在您接受NUBEQA治疗期间, 若休息或活动时出现胸部疼痛或不适, 或者呼吸急促, 请立即联系您的医疗服务提供者或就医。

癫痫发作

接受NUBEQA治疗可能增加癫痫发作的风险。应避免从事突然丧失意识可能对自身或他人造成严重伤害的活动。若在NUBEQA治疗期间出现意识丧失或癫痫发作, 请立即告知您的医疗服务提供者。

NUBEQA最常见的副作用包括:



Increase in liver
function tests



Decreased white blood
cells (neutropenia)



Feeling more
tired than usual

NUBEQA可能导致男性生育问题, 从而影响生育能力。若对生育能力存在担忧, 请咨询您的医疗服务提供者。

这些不是NUBEQA所有可能的副作用。

请致电您的医生, 咨询与副作用有关的医学建议。您可致电1-800-FDA-1088或访问www.fda.gov/medwatch向食品药物管理局(FDA)报告副作用。

*ADT(雄激素剥夺疗法)指通过药物或手术降低睾酮水平的治疗。

重要安全信息(续)

在服用NUBEQA之前, 告诉医疗服务提供者您的所有病症, 包括您是否:

- 有癫痫发作、脑损伤、中风或脑肿瘤病史
- 患有肾脏或肝脏疾病
- 已怀孕或计划怀孕。NUBEQA可对未出生的胎儿造成伤害并导致流产
- 有可以受孕的伴侣。男性患者若其女性伴侣可以受孕, 应在治疗期间及最后一次服用NUBEQA后的一周内采取有效的避孕措施。请与您的医疗服务提供者讨论避孕方法
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚NUBEQA是否会进入母乳

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实, 以及NUBEQA.com/PI 上的完整处方信息。

NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets

真实患者的故事

“我认为寻求第二意见是有必要的，这能让你确信自己选择了正确的治疗方案。”

- Steve, 服用NUBEQA®的真实患者



“对我来说，拥有适当的支持体系是最关键的一点。”

- Ryan, 服用NUBEQA®的真实患者



听取更多NUBEQA使用者及其照护者的故事

[访问我们的网站 >](#)

您想分享自己的故事吗？

注册并分享您的NUBEQA故事，或致电**1-800-288-8374**
与拜耳客服代表实时交流。

注册



重要安全信息(续)

告诉医疗服务提供者您使用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。NUBEQA可能影响其他药物的起效方式，其他药物也可能影响NUBEQA的起效方式。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 **14-15** 页关于NUBEQA的重要事实，以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。

NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets

支持与资源

服用NUBEQA®期间的支持

Access Services by Bayer™可为您提供支付NUBEQA费用的相关信息。如需咨询专员,请在周一至周五上午8点至晚上8点(美国东部时间)致电 **1-800-288-8374**。

若您是初次服用NUBEQA

请向您的医疗服务提供者咨询1个月的免费试用计划。



若您有商业保险

您可能有资格参加NUBEQA的**零共付额计划**。



若您有MEDICARE或MEDICAID

您可能有资格获得帮助支付NUBEQA的自付费用。

可能会有政府资助的援助。请访问medicare.gov/your-medicare-costs确认您的资格。

独立基金会也可能提供帮助。

CancerCare®
1-800-813-4673

HealthWell Foundation®
1-800-675-8416

PAN Foundation
1-866-316-7263

The Assistance Fund
1-855-845-3663

Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief
1-866-512-3861

IF YOU DO NOT HAVE INSURANCE

请联系拜耳美国患者援助基金会,该慈善机构可协助符合条件的患者免费获取拜耳处方药。

请在周一至周五上午9点至下午6点(美国东部时间)致电**1-866-228-7723**,或访问基金会官网patientassistance.bayer.us查询资格。

根据保险计划及其他因素,NUBEQA的费用可能因人而异。

如需了解承保范围及NUBEQA支付方式,请致电**1-800-288-8374**联系Access Services by Bayer专员。

重要安全信息(续)

在与开具NUBEQA处方的医疗服务提供者讨论之前,请勿开始或停止使用任何药物。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 **14-15** 页关于NUBEQA的重要事实,以及NUBEQA.com/PI上的完整处方信息。



NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets

照护者同样需要关怀

专为照护者打造的资源

作为照护者，照顾自己与照顾他人同样重要。以下资源提供专为您设计的建议与支持。



我对照护者的建议是：接受家人、亲友，乃至被照护者的帮助。”

- Nancy, 前护士，服用NUBEQA®的
真实患者的照护者



照护者小贴士



注重自身健康，保持均衡饮食
和规律运动。



在照料亲人时，主动寻求亲友
的帮助。



出门做些自己喜欢的事，比如约
朋友共进午餐或散步。

更多照护者建议请访问我们的[网站 >](#)

热线电话

CancerCare®

请拨打**1-800-813-HOPE (4673)**
周一至周四上午10点至下午6点(美国
东部时间)周五上午10点至下午5点
(美国东部时间)

癌症支持社区

拨打**1-888-793-9355**
获取心理健康支持

AARP

请拨打**1-877-333-5885**(英语服务)，
或**1-888-971-2013**(西班牙语服务)
周一至周五，上午8点至晚上8点
(美国东部时间)

前列腺癌支持团体

这些机构可协助您寻找本地支持团体、线上同伴支持，
并为前列腺癌患者的照护者提供建议。

零前列腺癌

前列腺癌基金会

前列腺癌研究所

服用NUBEQA的患者：感谢您的照护者

请从[我们的网站 >](#)下载选项，为支持者挑选并定制感谢卡

重要安全信息(续)

了解您所使用的药物。保留一份您的药物清单，以便在您获得新药时向医疗服务提供者和药剂师出示。

请参阅全文中的其他重要安全信息、第 [14-15](#) 页关于NUBEQA的重要事实，以及 [NUBEQA.com/PI](#) 上的完整处方信息。



NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets

关于NUBEQA®(darolutamide)片剂的重要事实

发音为new-BECCA

什么是NUBEQA?

NUBEQA是一种处方药,用于治疗符合以下情况的前列腺癌成年患者:

- 前列腺癌未扩散到身体其他部位,且对降低睾酮水平的药物或手术不再有反应
- 前列腺癌已扩散到身体其他部位,且对降低睾酮水平的药物或手术有反应
- 前列腺癌已扩散到身体其他部位,且对联合多西他赛降低睾酮水平的药物或手术有反应。

目前尚不了解NUBEQA对女性或者儿童是否安全有效。

服用NUBEQA前,我应告诉医疗服务提供者什么?

告诉医疗服务提供者您的所有病症,包括您是否:

- 有心脏问题
- 有高血压
- 有糖尿病
- 血液中脂肪或胆固醇含量过高(血脂异常)
- 有癫痫发作、脑损伤、中风或脑肿瘤病史
- 患有肾脏或肝脏疾病
- 已怀孕或计划怀孕。NUBEQA可对未出生的胎儿造成伤害并导致流产。
- 有可以受孕的伴侣。男性患者若其女性伴侣可以受孕,应在治疗期间及最后一次服用NUBEQA后的一周内采取有效的避孕措施。请与您的医疗服务提供者讨论避孕方法。
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚NUBEQA是否会进入母乳。

请告诉医疗服务提供者您使用的所有药物,包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。NUBEQA可能影响其他药物的起效方式,其他药物也可能影响NUBEQA的起效方式。

在与开具NUBEQA处方的医疗服务提供者讨论之前,请勿开始或停止使用任何药物。

了解您所使用的药物。保留一份您的药物清单,以便在您获得新药时向医疗服务提供者和药剂师出示。

如何服用NUBEQA?

- 严格按照医疗服务提供者的指示服用NUBEQA。
- 若出现某些副作用,医疗服务提供者可能会调整剂量、暂时停药或完全停止NUBEQA治疗。
- 每日两次,随餐服用处方剂量的NUBEQA。
- 整片吞服NUBEQA片剂。
- 若您正在接受促性腺激素释放激素(GnRH)治疗,您应在服用NUBEQA期间继续进行此治疗,除非您已接受过手术降低体内睾酮水平(即外科去势手术)。
- 若您漏服了一剂NUBEQA,请在想起后立即在服用下一剂的时间之前补服处方的剂量。不要通过一次服用两剂来弥补错过的剂量。
- 若服用超过处方剂量的NUBEQA,请立即联系医疗服务提供者。

关于NUBEQA的重要事实续下页。

完整处方信息请参阅NUBEQA.com/PI。



关于NUBEQA®(darolutamide)片剂的重要事实

发音为new-BECCA

NUBEQA可能产生什么副作用？

NUBEQA可能引起严重副作用，包括：

- **心脏病。**在接受NUBEQA治疗期间，部分患者出现心脏动脉阻塞(缺血性心脏病)，可能导致死亡。在您接受NUBEQA治疗期间，医疗服务提供者会监测您是否出现心脏问题的症状和体征。在您接受NUBEQA治疗期间，若休息或活动时出现胸部疼痛或不适，或者呼吸急促，请立即联系您的医疗服务提供者或就医。
- **癫痫发作。**接受NUBEQA治疗可能增加癫痫发作的风险。应避免从事突然丧失意识可能对自身或他人造成严重伤害的活动。若在NUBEQA治疗期间出现意识丧失或癫痫发作，请立即告知您的医疗服务提供者。

NUBEQA最常见的副作用包括：

- 肝功能检查指标升高
- 白细胞减少(中性粒细胞减少症)
- 感觉比平时更疲倦

NUBEQA联合多西他赛最常见的副作用包括：

- | | |
|--------|-------------|
| • 便秘 | • 红细胞减少(贫血) |
| • 皮疹 | • 高血糖 |
| • 食欲下降 | • 白细胞减少 |
| • 出血 | • 肝功能检查指标升高 |
| • 体重增加 | • 低血钙 |
| • 高血压 | |

NUBEQA可能导致男性生育问题，从而影响生育能力。若对生育能力存在担忧，请咨询您的医疗服务提供者。

这些不是NUBEQA所有可能的副作用。

请致电您的医疗服务提供者，征求有关副作用的医疗建议。您可拨打1-800-FDA-1088向FDA报告副作用。

如何储存NUBEQA？

- 请将NUBEQA储存于68°F至77°F(20°C至25°C)的室温。
- 首次开启药瓶后，请始终将瓶盖拧紧。

请将NUBEQA及所有药物置于儿童无法触及之处。

本文所提供的信息并非详尽无遗。了解关于NUBEQA的更多信息：

- 请咨询您的医疗服务提供者或药剂师
- 访问NUBEQA.com获取FDA批准的产品标签
- 致电拜耳客服热线：1-888-842-2937

完整处方信息请参阅[NUBEQA.com/PI](#)。



如需了解关于NUBEQA®的更多信息,
请咨询您的医生或访问NUBEQA.com。



© 2025拜耳。保留所有权利。BAYER、拜耳十字标志和NUBEQA均为拜耳公司的
注册商标, Access Services by Bayer也是拜耳公司的商标。
PP-NUB-US-4701-1 10/25

A
NUBEQA
(darolutamide) 300 mg tablets